Máximo®

FORTIFICANTE – PROTECTOR

FORTALECE LAS PLANTAS Y LAS PROTEGE FRENTE A ENFERMEDADES. ESTIMULA LAS DEFENSAS

COMPOSICIÓN (% p/p):

Extractos biomarinos (algas unicelulares y sales minerales de Cu y otras): 10,5%
Ácidos orgánicos polihidroxicarboxílicos: 10,0%
Líquido Soluble (SL); pH: 8,5

O.M.D.F. Notificado al Registro Oficial de P. y M.F. según Orden APA/1470/2007, de 29 de mayo de 2007

Agricultura Ecológica: Insumo reconocido por el CAAE y AGROCOLOR para su uso en Agricultura Ecológica. Composición y fabricación conforme al Reglamento (CE) 834/2007 y al anejo II del R. (CE) 889/2008.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Máximo® es un complejo a base de extractos biomarinos, ricos en sales minerales (Cu, Zn, etc.) y ácidos orgánicos de origen vegetal, que facilitan su absorción y transporte sistémico por la planta sin causar fiotoxicidad, y su disponibilidad en los lugares de mayor necesidad. Compatible y muy asimilable. La presencia de sales minerales y el complejante que hace de sistema "lanzadera" actúan con extrema rapidez, e inducen a la planta a producir sustancias de defensa, fortaleciéndola frente a enfermedades (muy amplio espectro) principalmente vasculares (Verticiliosis, *Phytophthora*, *Armillaria*, *Fusarium, Botrytis c.* vascular) y algunas de desarrollo interno-externo, como ciertos mildius y algunas alternarias. También es eficaz sobre Cercosporas, *Septorias*, bremias, lepra, momentos sensibles de la *Esclerotinia*, *Helminthosporium*, *Pyricularia oryzae*, *Rhyzoctonia*, *Phytium*, *Fusarium*, *Mycosphaerella*, y otras enfermedades del suelo, hojas y frutos).

APLICACIONES. DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Es útil en plantaciones agrícolas y forestales sensibles a enfermedades diversas. Se aplica en el agua de riego o en pulverización foliar según cultivos y situaciones, como protector de enfermedades vasculares e internas en general, y algunos patógenos de superficie de raíz, frutos y hojas.

A dosis elevadas, superiores a 3,0 L/Ha, es capaz de ofrecer protección sobre un muy amplio espectro de enfermedades causadas por hongos patógenos, incluso emplearse con máxima eficacia con carácter de choque y curativo. No resulta muy eficaz contra bacterias, pero en enfermedades mixtas (complejo fúngico-bacteriano del cuello y raíz, en hortícolas y otros), la mezcla con **Kristal** (2,0 + 2,0 ml/L) es muy efectiva.

Fresales, frambuesos, zarzamoras, bayas y pequeños frutos (mirtilos, arañones, etc,) y hortícolas de invernadero y extensivas

En riego: INVERNADERO, de 2,0 a 2,50 L/Ha en arenado, y 2,5 a 3,0 L/Ha en suelo, cada 20 días. EXTENSIVOS, a 2,0 a 3,0 L/Ha y 2-4 tratamientos por ciclo.
En foliar: Preventivo a 1,5-2,5 cc/L, cada 15-20 días. En choque a 2,5-3,5 cc/L. Dosis más altas y plazos más cortos en choque, o a primeros síntomas. Realizar una prueba previa al aplicar foliar en vegetación (solo hasta botón rosa) sobre variedades sensibles a sales metálicas como ciertos prunos.

En variedades leñosas sensibles (algunas variedades de prunos):
Prevención en frutos y hojas.
Preferentemente en riego: Enfermedades vasculares, cuello y raíz (*Armillaria*, *Rosellinia*, "asfixia radicular", etc.) a 2,5-3,0 L/Ha, min. 2 pases con riesgo. Dar un 3er tratamiento a 2,0 L/Ha en caída de pétalos.
En foliar: a 2-3 cc/L (desde la caída de hoja a inicio de floración), 2 tratamientos. En formación de fruto (tras cuaje), bajar a 1,0 cc/L.

En lepra de los frutillos de hueso (excepto variedades sensibles que se aplicara preferentemente vía riego o foliar sólo desde el hinchado de yemas hasta inicio de la floración, a 2,0-3,0 ml/L agua, y a partir del cuajado, hasta una dosis de 1,5 ml/L agua), en *Botrytis c.* y *Mycosphaerella* del fresón, frambueso y grosellero, aplicar en mezcla con Biosilence a 2 + 2 cc/L por su poder hidrófugo y secante, sobretodo en épocas húmedas. Con fuertes ataques de *Armillaria*, *Phytophthora* y *Rosellinia* mezclar con una dosis mínima de **Elrond** lo que mejorará espectacularmente su rapidez de acción y eficacia (aplicación por vía riego a 3,0 L/Ha + 1,0 Kg/Ha).

COMPATIBILIDAD EN MEZCLAS

Máximo® es compatible con los agroquímicos habituales. Con aminoácidos emplear las dosis más bajas del aminoácido. Por vía foliar, no mezclar con aceites, azufres ni compuestos de reacción alcalina o compuestos muy ácidos

Presentación: 1 L, 5 L y 10 Litros.

Blue Heron
Plant BioDynamics
C/ Primavera, 90 B
28430 MADRID
Tel.: 00 34 91 857 14 34
info@blueheron.es
www.blueheron.es